ХЕМОТЕКА
ЦЕНТР ПЕРСОНАЛІЗОВАНОЇ ФАРМАЦІЇ

0800 402 022
050 440 90 62
office@chemoteka.com.ua

вул. Чигиринська, 21/11
Черкаси, 18030, Україна
chemoteka.com

Интерферон альфа + Бевацизумаб XA149 + XA060 (европейский протокол) Рак почки

Дни терапии	Лекарственное средство	Дозировка, мг/м^2	Растворитель	Объем (мл / шт)	Время введения	Путь введения
1	Бевацизумаб	10 мг/кг	0,9% NaCl	100 мл	90 минут	внутривенно
1, 3, 5, 8, 10, 12	Интерферон альфа	3 MME (const)	-	0	-	подкожно

График введения препаратов:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Бевацизумаб														
Интерферон альфа														

Дополнительная информация

ПОВТОРНО НА:
15 (день)

КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ:
2

Примечание:
Количество циклов: Интерферон альфа: макс. 52 недели или в течение всей болезни; Бевацизумаб: во время всей болезни.
(*) Бевацизумаб: Начальную дозу вводят в течение 90 минут. В случае хорошей переносимости первой инфузии, вторую инфузию вводят в течение 60 минут. В случае хорошей переносимости 60-минутной инфузии, все последующие инфузии можно вводить в течение 30 минут.
По результатам ретроспективного анализа, дозу ИФН корректируют до 6 MME (61% пациентов) или до 3 MME (31% пациентов) без потери эффективности.
Авторы: Thomas Kühr, Ewald Wöll, Josef Thaler (руководство «Протоколы химиотерапии 2016. Текущие протоколы и таргетная терапия» (17-е издание, Инсбрук).
Последнее изменение содержания: январь 2016 г.
Литература:
Escudier B. et al., Lancet 370: 210ff, 2007; Melichar B. et al., Ann Oncol 19: 1470ff, 2008.