chemoteka.com



Топотекан / Бевацизумаб XC836 + XA060 (европейский протокол) Рак яичника

Дни терапии	Лекарствен ное средство	Дозировка, мг/м²	Растворите ль	Объем (мл / шт)	Время введения	Путь введения		
1, 15	Бевацизума б	10 мг/кг	0,9% NaCl	100 мл	90 минут	внутривенно		
1, 8, 15	Топотекан	4	0,9% NaCl	50 мл	30 минут	внутривенно		

График введения препаратов:

_				_							_		_				_		_								_	$\overline{}$
1	2	m	4	2	9	7	8	6	10	11	12	13	14	15	91	11	18	19	20	21	22	23	24	25	97	27	28	59
Бевацизумаб																												
Топотекан																												

Дополнительная информация

повторно на: **29 (день)**

количество циклов: 6



Примечание:

Топотекан разводят до 0,025-0,05 мг/мл. (*) Бевацизумаб: Начальную дозу вводят в течение 90 минут. В случае хорошей переносимости первой инфузии, вторую инфузию вводят в течение 60 минут. В случае хорошей переносимости 60-минутной инфузии, все последующие инфузии можно вводить в течение 30 минут.

Авторы: <u>Thomas Kühr</u>, <u>Ewald Wöll</u>, <u>Josef Thaler</u> (руководство «Протоколы химиотерапии 2016. Текущие протоколы и таргетная терапия» (17-е издание, Инсбрук).

Последнее изменение содержания: январь 2016 г.

Литература:

Pujade-Lauraine E. et al., J Clin Oncol 32: 1302ff, 2014.