ХЕМОТЕКА
ЦЕНТР ПЕРСОНАЛІЗОВАНОЇ ФАРМАЦІЇ

0800 402 022
050 440 90 62
office@chemoteka.com.ua

вул. Чигиринська, 21/11
Черкаси, 18030, Україна
chemoteka.com

Цисплатин / Этопозид / Ифосфамид XC796 (европейский протокол) Рак яичка

Дни терапии	Лекарственное средство	Дозировка, мг/м^2	Растворитель	Объем (мл / шт)	Время введения	Путь введения
1-5	Ифосфамид	1200	0,9% NaCl	500 мл	1 час	внутривенно
1-5	Цисплатин	20	0,9% NaCl	500 мл	30 минут	внутривенно
1-5	Этопозид	75	0,9% NaCl	1000 мл	1 час	внутривенно

График введения препаратов:

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
Ифосфамид																													
	■	■	■	■	■																								
Цисплатин																													
	■	■	■	■	■																								
Этопозид																													
	■	■	■	■	■																								

Дополнительная информация

ПОВТОРНО НА:
29 (день)

КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ:
5

Примечание:
Месна: 20% дозы Ифосфамида, через 0, 4, 8 ч после приема Ифосфамида (перорально или внутривенно).
Повышенный риск токсичности для ЦНС, если альбумин ≤3.5 г/дл.
Цисплатин (только если СКФ ≥60 мл/мин.):
Сопутствующая медикация:
Премедикация: 500 мл 0,9% раствора NaCl + 10 мЭкв KCl + 8 мЭкв MgSO4 внутривенно в течение 60 мин.
200 мл 20% раствора Маннита в течение 30 мин.
Постмедикация: 500 мл 0,9% раствора NaCl внутривенно + 10 мЭкв KCl.
Авторы: Thomas Kühr, Ewald Wöll, Josef Thaler
(руководство «Протоколы химиотерапии 2016. Текущие протоколы и таргетная терапия» (17-е издание, Инсбрук).
Последнее изменение содержания: январь 2016 г.
Литература:

Loehrer P.J. et al., J Clin Oncol 16: 2500ff, 1998.