



Пеметрексед / Бевацизумаб (локальный протокол) Рак легких

Дни терапии	Лекарственное средство	Дозировка, мг/м²	Растворитель	Объем (мл/ шт)	Время введения	Путь введения		
1	Бевацизумаб	15 мг/кг	0,9% NaCl	100 мл	90 минут	внутривенно		
1	Пеметрексед	500	0,9% NaCl	100 мл	10 минут	внутривенно		

График введения препаратов:

	2	m	4	5	9	7	8	6	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	56	27	28	29
Бевацизумаб																												
Пеметрексед																												

Дополнительная информация

Примечание:

За 1-3 недели до начала терапии Пеметрекседом:

- Замещение с использованием 350-1000 мкг фолиевой кислоты перорально каждые сутки до 3-х недель после завершения терапии.
- Замещение витамином B12: 1000 мкг в/м (раз в 9 недель) до 3 недель после завершения терапии.
- Оральный прием Дексаметазона 8 мг перорально каждые сутки в течение 3 суток, начиная за 1 день до начала приема Пеметрекседа.
- (*) Бевацизумаб: Начальную дозу вводят в течение 90 минут. В случае хорошей переносимости первой инфузии, вторую инфузию вводят в течение 60 минут. В случае хорошей переносимости 60-минутной инфузии, все последующие инфузии можно вводить в течение 30 минут.

В соответствии с EMA, Бевацизумаб, как дополнение к химиотерапии препаратами платины, был утвержден в дозе 7,5 мг/кг или 15 мг/кг.


Паспортная часть: нозология - рак легкого; код по мкб -10 - с 33, с 34.

Потенциальные пользователи - отделение опухолей органов грудной полости Национального института рака.

Авторство: Национальный институт рака

Литература:

Локальный протокол медицинской помощи и клинический маршрут больных раком легкого.



количество циклов: 6

