

## Карбоплатин / Иринотекан (локальный протокол) Мелкоклеточный рак легкого - МРЛ

Дни терапии	Лекарственное средство	Дозировка, мг/м <sup>2</sup>	Растворитель	Объем (мл / шт)	Время введения	Путь введения
1, 8, 15	Иринотекан	50	0,9% NaCl	250 мл	90 минут	внутривенно
1	Карбоплатин	AUC 5	5% Глюкоза	500 мл	30 минут	внутривенно

### График введения препаратов:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
<b>Иринотекан</b>																												
■							■							■														
<b>Карбоплатин</b>																												
■																												

### Дополнительная информация

**Примечание:**

**Расчет дозы Карбоплатина (формула Calvert):**

**Доза (мг) = целевая AUC x (СКФ + 25).**

**Внимание! Иринотекан может вызвать опасную для жизни диарею и холинергический синдром. Диарея может возникнуть либо в острой форме, либо в некоторые дни после введения Иринотекана.**

**Сопутствующая медикация: Атропин 0,2 мг подкожно или внутривенно**

**В случае диареи: Лоперамид, сначала 4 мг, затем по 2 мг каждые 2 часа. Прием Лоперамида следует продолжать еще в течение 12 часов после прекращения диареи. Если она сохраняется более 48 часов или в случае лихорадки, рекомендовано назначение Ципрофлоксацина и госпитализация.**

**Паспортная часть: нозология - рак легкого; код по МКБ -10 - с 33, с 34.**

**Потенциальные пользователи - отделение опухолей органов грудной полости Национального института рака.**

**Авторство: [Национальный институт рака](#)**

**Литература:**

**Локальный протокол медицинской помощи и клинический маршрут больных раком легкого.**

**ПОВТОРНО НА:  
29 (день)**

**КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ:  
6**

