

chemoteka.com

office@chemoteka.com.ua





Дни терапии	Лекарственное средство	Дозировка, мг/м²	Растворитель	Объем (мл/ шт)	Время введения	Путь введения	
1-3	Ифосфамид	1330	0,9% NaCl	500 мл	24 часа	внутривенно	
1-3	Месна	1330	0,9% NaCl	500 мл	24 часа	внутривенно	
1	Митоксантрон	8	0,9% NaCl	100 мл	1 час	внутривенно	
1-3	Этопозид	65	0,9% NaCl	500 мл	2 часа	внутривенно	

График введения препаратов:

XEM®TEKA

ЦЕНТР ПЕРСОНАЛІЗОВАНОЇ ФАРМАЦІЇ

н	2	c	4	5	9	7	8	6	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Иф	Ифосфамид																				
Месна																					
Митоксантрон																					
Этопозид																					

Дополнительная информация

ПОВТОРНО НА: 22 (день)

КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ: 6

Примечание:

Нозология - рецидив лимфомы Ходжкина, неходжкинских лимфом.

Протокол предназначен для отделения онкогематологии с группой адъювантных методов лечения, отделение лучевой терапии Национального института рака. Цель - предоставление диагностической и лечебной помощи больным с рецидивом лимфом в Национальном институте рака.

Важно - Месна вводить по схеме, затем 500 мг/сут в/венно, начиная через 4 часов после окончания инфузии ифосфамида, 1-3 день.

Авторство: Национальный институт рака

