

СЕРР(В) (локальний протокол) Ходжкінська лимфома

Дни терапії	Лекарственное средство	Дозировка, мг/м ²	Растворитель	Объем (мл / шт)	Время введения	Путь введения
1,15	Блеомицин	15	-	-	болюсно	внутривенно
1-10	Преднизолон	60	-	-	-	перорально
1-10	Прокарбазин	60	-	-	-	перорально
1,8	Циклофосфамид	600	0,9% NaCl	500 мл	1 час	внутривенно
1-3	Этопозид	70	0,9% NaCl	500 мл	1 час	внутривенно

График введения препаратов:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Блеомицин																					
Преднизолон																					
Прокарбазин																					
Циклофосфамид																					
Этопозид																					

Дополнительная информация

**ПОВТОРНО НА:
22 (день)**

**КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ:
6**

Примечание:

Нозология - рецидив лимфомы Ходжкина, неходжкинских лимфом.

Протокол предназначен для отделения онкогематологии с группой адъювантных методов лечения, отделение лучевой терапии Национального института рака.

Важно - Месна (Mesna) 20% дозы Циклофосфамида, через 0, 4 и 8 ч. после приема Циклофосфамида.

Авторство: [Национальный институт рака](#)

