ХЕМОТЕКА
ЦЕНТР ПЕРСОНАЛІЗОВАНОЇ ФАРМАЦІЇ

0800 402 022
050 440 90 62
office@chemoteka.com.ua

вул. Чигиринська, 21/11
Черкаси, 18030, Україна
chemoteka.com

Паклитаксел / Карбоплатин / Бевацизумаб XC204 + XA060 (европейский протокол) Немелкоклеточный рак легкого - НМРЛ

Дни терапии	Лекарственное средство	Дозировка, мг/м^2	Растворитель	Объем (мл / шт)	Время введения	Путь введения
1	Бевацизумаб	15 мг/кг	0,9% NaCl	100 мл	90 минут	внутривенно
1	Карбоплатин	AUC 6	5% Глюкоза	500 мл	30 минут	внутривенно
1	Паклитаксел	225	0,9% NaCl	500 мл	3 часа	внутривенно

График введения препаратов:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Бевацизумаб																					
Карбоплатин																					
Паклитаксел																					

Дополнительная информация

ПОВТОРНО НА:
22 (день)

КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ:
2

Примечание:
Паклитаксел разводят до 0,3-1,2 мг/мл.
Сопутствующая медикация до Паклитаксела:
Премедикация: Дексаметазон, 20 мг внутривенно за 30 минут до Паклитаксела или Дексаметазона - 20 мг орально за 12 и 6 часов до Паклитаксела. Рекомендована дополнительная премедикация 50 мг Ранитидина и 30 мг Дифенгидрамина.
Разведенные растворы Паклитаксела вводят через инфузионные системы без ПВХ.
Расчет дозы Карбоплатина (формула Calvert):
Доза (мг) = целевая AUC x (СКФ + 25).
(*) Бевацизумаб: Начальную дозу вводят в течение 90 минут. В случае хорошей переносимости первой инфузии, вторую инфузию вводят в течение 60 минут. В случае хорошей переносимости 60-минутной инфузии, все последующие инфузии можно вводить в течение 30 минут.
В соответствии с EMA, Бевацизумаб, как дополнение к химиотерапии препаратами платины, был утвержден в дозе 7,5 мг/кг или 15 мг/кг.
Авторы: Thomas Kühr, Ewald Wöll, Josef Thaler (руководство «Протоколы химиотерапии 2016. Текущие протоколы и таргетная терапия» (17-е издание, Инсбрук).
Последнее изменение содержания: январь 2016 г.
Литература:

Sandler A. et al., N Engl J Med 355: 2542ff, 2006.