


# Гемцитабін / Цисплатин ХС592 (європейський протокол) Рак сечового міхура

Дні терапії	Лікарський засіб	Дозування, мг/м <sup>2</sup>	Розчинник	Об'єм (мл / шт)	Час введення	Шлях введення
1, 8, 15	Гемцитабін	1000	0,9% NaCl	250 мл	30 хвилин	внутрішньовенно
2	Цисплатин	70	0,9% NaCl	500 мл	1 година	внутрішньовенно

## Графік введення препаратів:



## Додаткова інформація

ПОВТОРНО НА:  
**29 (день)**

КІЛЬКІСТЬ ЦИКЛІВ:  
**6**

### Примітка:

Цисплатин (лише якщо ШКФ ≥60 мл/хв):

### Супутня медикація:

Премедикація: 500 мл 0,9% розчину NaCl + 10 мЕкв KCl + 8 мЕкв MgSO<sub>4</sub> внутрішньовенно протягом 60 хв.

200 мл 20% розчину Манніту протягом 30 хв.

Постмедикація: 500 мл 0,9% розчину NaCl внутрішньовенно + 10 мЕкв KCl.

Автори: [Thomas Kühr](#), [Ewald Wöll](#), [Josef Thaler](#)

(керівництво «Протоколи хіміотерапії 2016.

Поточні протоколи і таргетна терапія» (17-е видання, Інсбрук).

Остання зміна змісту: січень 2016 р.

### Література:

[Von der Maase H., J Clin Oncol 18: 3068ff, 2000.](#)

