

Трастузумаб ХА110 (європейський протокол) Рак молочної залози

Дні терапії	Лікарський засіб	Дозування, мг/м ²	Розчинник	Об'єм (мл / шт)	Час введення	Шлях введення
1	Трастузумаб	6* мг/кг	0,9% NaCl	250 мл	90 хвилин	внутрішньовенно

Графік введення препаратів:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Трастузумаб																					

Додаткова інформація

**ПОВТОРНО НА:
22 (день)**

**КІЛЬКІСТЬ ЦИКЛІВ:
12**

Примітка:

Кількість циклів: Тривалий прийом - понад 12 місяців.

(*) "Фіксована навантажувальна доза"

Трастузумабу - 8 мг/кг, зі швидкістю першого введення протягом 90 хвилин. У разі гарної переносимості, наступні дози можна вводити протягом 30 хвилин.

Трастузумаб також можна призначати підшкірно у постійній дозі 600 мг/5 мл.

Автори: [Thomas Kühr](#), [Ewald Wöll](#), [Josef Thaler](#) (керівництво «Протоколи хіміотерапії 2016. Поточні протоколи і таргетна терапія» (17-е видання, Інсбрук).

Остання зміна змісту: січень 2016 р.

Література:

Piccart-Gebhard M.J. et al., N Engl J Med 355: 1659ff, 2005; Romond E.H. et al., N Engl J Med 355: 1673ff, 2005; Ismael G. et al., Lancet Oncol 13: 869ff, 2012.

